

ADVIES

Aan : ROAZ GHOR Strategisch Kernteam COVID-19.
Van : RAI-NN (SIF/REDIAM/UMCG MMBI/GGD-en)
Onderwerp : Update infectiepreventie maatregelen rond COVID-19 –
Zorg buiten de ziekenhuizen
Datum : **05-11-2021**

Advies

Naar aanleiding van de persconferentie van 2 november jongsleden adviseert de RAI-NN om voor de noordelijke regio de maatregelen voor zorg buiten de ziekenhuizen aan te scherpen. We zien de aantallen infecties landelijk en ook in de regio weer oplopen. Zowel de ziekenhuisopnames als de infecties in de zorg buiten de ziekenhuizen laten een stijgende trend zien.

Het advies is om de maatregelen zoals geadviseerd in het Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg versie 28-10-2021 van Verenso te volgen. Hierin wordt in paragraaf 2.2 "Maatregelen bij verhoogde (boven) regionale prevalentie" geadviseerd om bij risiconiveau ernstig, zoals de huidige situatie, extra algehele maatregelen te handhaven, waaronder:

- Ga over tot het preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers (minimaal type II) vanaf het betreden van het verpleeghuis door medewerkers en bezoekers.
- Scherp de 1,5 meter regel weer aan.
- Raad bezoekers sterk af om te komen als ze luchtwegklachten hebben, ook bij een negatieve test voor Covid-19. Verspreiding van de overige respiratoire virussen maken het te voeren beleid nog complexer.
- Thuiswerkadvies conform landelijke richtlijn: dringend advies om in ieder geval voor 50% thuis te werken wanneer mogelijk.
- Plan bijeenkomsten/ overleggen online als het kan en fysieke overleggen t.b.v. primair proces met inachtneming van de geldende regels w.o. de 1,5 meter regel.
- Laagdrempelig testen van zorgmedewerkers met klachten blijft van groot belang.

Dit geldt voor de verpleeghuissector, voor instellingen in de verstandelijk gehandicapten zorg en geestelijke gezondheidszorg met aan verpleeghuispopulatie gelijkwaardige kwetsbare doelgroepen.

Zorg in de thuissituatie, huisartsen, ambulancezorg, etc.:

- Thuissituatie en ambulancezorg: werk buiten met chirurgisch mondneusmasker type IIR bij zorg binnen de 1,5 meter. Draag bij het betreden van een woning een chirurgisch mondneusmasker type IIR.
- In praktijken (huisarts, verloskundigen) is het advies zowel patiënten, begeleiders als medewerkers een mondneusmasker te laten dragen bij het betreden van de praktijk.
- Laagdrempelig testen van zorgmedewerkers met klachten blijft van groot belang.
