

ADVIES

Aan : ROAZ GHOR Strategisch Kernteam COVID-19

Van : RAI-NN (SIF/REDIAM/UMCG MMBI/GGD-en)

Onderwerp : Aanpassing COVID-19 maatregelen voor ziekenhuiszorg en VVT

Datum : 16-05-2022

Gezien de dalende incidentie nemen we zo goed als de laatste stap in het schema voor afschalen. We streven ernaar om naar een duurzaam nieuw normaal te gaan. Dit betekent uiteraard dat er wel geanticipeerd wordt op de verschillende seizoenen en zijn we ons bewust van de opmars van de varianten Omikron BA4 en BA5. We zijn van mening dat genoemde versoepelingen doorgang kunnen vinden en houden uiteraard een vinger aan de pols.

Zie in de tabel hieronder de actuele wijzigingen in geel.

Samenvattend

- Blijven uitdragen: gun elkaar de ruimte
- Quarantaine vervalt voor patiënten en medewerkers
- Asymptotisch testen vervalt voor iedereen
- Masker < 1.5m in patiëntenzorg vervalt, behalve bij respiratoire klachten.

Dit advies gaat in op **30 mei** en vervangt op dat moment het advies d.d. 12-04-2022.

Maatregelen tabel Ziekenhuiszorg

Onderwerp	Maatregel	Opmerking / verduidelijking
Isolatiemaatregelen bij COVID	Bij zowel bewezen als verdenking COVID: Contact-druppel isolatie Einddesinfectie na bezoek van een COVID patient op de SEH en poli's mag komen te vervallen. Hier geldt weer de standaard reiniging en desinfectie voor contact-druppel isolatie op de poliklinieken.	Dit is incl een spatbril. (Er is landelijke discussie om isolatie voor COVID gelijk te trekken met Influenza).
Dragen mondneusmasker in het ziekenhuis voor bezoekers en patiënten	Het dragen van een mondneusmasker is niet meer verplicht. Bij respiratoire klachten wordt wel verzocht om een mondneusmasker te dragen in het ziekenhuis.	Overweeg mondneusmaskers aan te bieden voor patiënten/bezoekers die het prettig vinden om er een te

		dragen.
Dragen mondneusmaskers medewerkers	Maskergebruik door medewerkers bij zorg binnen de 1.5 m vervalt. Draag een FFP2 mondneusmasker bij de bekende indicaties.	Mondneusmasker type 2R wordt gedragen bij respiratoire klachten.
COVID- triage SEH	Uitvraag behouden tot na pandemie	Uitvraag beperken tot corona-gerelateerde klachten. Coronalink vervalt in uitvraag.
Bron en contactonderzoek – nauwe contacten (patiënten)	Quarantaine vervalt voor patiënten. BCO alleen bij uitbraken. Testen bij klachten	Geen isolatie & testen meer bij coronalink.
Dagelijkse uitvraag klachten bij alle opgenomen patiënten en rooming- in personen	Behoud de uitvraag bij opname en op de SEH.	
Screenen voor operatie	Preoperatieve OK-screening vervalt conform FMS beleid - bij laag transmissie risico (staat gelijk aan risiconiveau 1-waakzaam).	
Testbeleid en inzet medewerkers	Zorg binnen de ziekenhuizen: FMS Leidraad	Alleen testen bij klachten. Quarantaine bij coronacontact vervalt. Asymptotisch testen en dragen van mondneusmasker vervalt hiermee ook.
Restaurantfunctie	De 1,5 meter afstand regel vervalt. Bezoekers en patiënten mogen gebruik maken van het restaurant.	

Maatregelen tabel VVT

(Verpleeghuissector, thuiszorg/wijkverpleging en instellingen in de verstandelijk gehandicapten zorg en geestelijke gezondheidszorg met aan verpleeghuispopulatie gelijkwaardige kwetsbare doelgroepen.)

Mondneusmasker beleid bezoek	Het dragen van een mondneusmasker is niet meer verplicht. Bij respiratoire klachten wordt wel verzocht om een mondneusmasker te dragen in de zorginstelling.	Overweeg mondneusmaskers aan te bieden voor patiënten/bezoekers die het prettig vinden om er een te dragen.
Dragen mondneusmasker medewerkers	Maskergebruik door medewerkers bij zorg binnen de 1.5 m vervalt. Draag een FFP2 mondneusmasker bij de bekende indicaties.	Mondneusmasker type 2R wordt gedragen bij respiratoire klachten.
Testbeleid en inzet medewerkers	Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen: LCI beleid	Het LCI beleid is nog niet aangepast mbt asymptomatisch testen. Maak als instelling een keuze of er asymptomatische getest moet worden.