

ADVIES

Aan : ROAZ GHOR Strategisch Kernteam COVID-19

Van : RAI-NN (SIF/REDIAM/UMCG MMBI/GGD-en)

Onderwerp : Aanpassing COVID-19 maatregelen voor ziekenhuiszorg en VVT

Datum : 23-06-2022

Op dit moment is er een snelle stijging van het aantal SARS-CoV-2 positieve personen, veroorzaakt door omicronsubvarianten BA.4 en BA.5 waartegen de reeds opgewekte immuniteit minder goed beschermt tegen het ontstaan en verspreiden van infecties. De toename is zichtbaar in rioolwatermetingen, toegenomen uitval van zorgpersoneel door SARS-CoV-2 en meerdere zorginstellingen met verspreiding van SARS-CoV-2 onder personeel en patiënten. Een aanpassing van de COVID-19 maatregelen voor ziekenhuizen en VVT's is op zijn plaats omdat wij willen voorkomen dat kwetsbare patiënten/clienten besmet worden door zorgpersoneel. Daarnaast een aanvullend advies voor zorgmedewerkers onderling om de kans op meerdere positieve medewerkers op één afdeling te verminderen waardoor een capaciteitsprobleem kan ontstaan. De personele bezetting blijft problematisch en zorgelijk, zeker richting zomerperiode

In het advies wordt de voorkeur gegeven aan het laagdrempelig gebruik van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) i.p.v. >1,5 m afstand houden, omdat >1,5 m afstand houden weer impact heeft op de afschaling van zorg.

Zie hieronder in **geel** de actuele wijzigingen:

Samenvattend

- Blijven uitdragen: gun elkaar de ruimte
- Testen bij klachten
- Masker dragen bij klachten
- Gebruik van chirurgisch mondneusmaskers type IIR, tenminste door zorgmedewerkers bij patiëntencontact binnen de <1.5m.
- Gebruik van zelftesten als zorgmedewerkers grotere sociale teamactiviteiten hebben met medewerkers onderling.

Dit advies gaat zo snel mogelijk in en vervangt op dat moment het advies d.d. 30-05-2022.

Nieuwe maatregelen tabel Ziekenhuiszorg en VVT ((Verpleeghuissector, thuiszorg/wijkverpleging en instellingen in de verstandelijk gehandicapten zorg en geestelijke gezondheidszorg met aan verpleeghuispopulatie gelijkwaardige kwetsbare doelgroepen.)

Mondneusmasker gebruik medewerkers	Gebruik mondneusmaskers door alle medewerkers bij patiëntencontact binnen de 1.5 m. (In de VVT bij langdurige zorgverlening) Overweeg in de VVT om per cliënt te inventariseren of die wil dat de medewerker een mondneusmasker draagt bij de verzorging. Draag bij een uitbraak op de afdeling mondneusmasker gedurende de gehele dienst.	Mondneusmasker type 2R wordt gedragen bij respiratoire klachten, ook bij negatieve SARS-CoV-2 test. De incidentie is te laag om standaard continu mondneusmaskergebruik te adviseren binnen de muren van de zorginstellingen
Mondneusmasker voorbezoekers en patiënten	Algemeen maskergebruik voor bezoekers en patiënten wordt nu niet geadviseerd.	
Testbeleid en inzet medewerkers	Testen bij klachten: - Gebruik bij voorkeur PCR zoals landelijk geadviseerd. - Zelftesten kunnen geaccepteerd worden, met de voorwaarde dat ze opeenvolgend uitgevoerd worden op dag 1 én 2 van de klachten. Door de herhaling van de test worden toch meer infecties gevonden en wordt de slechtere gevoeligheid t.o.v. de PCR deels gecompenseerd. Het gebruik van zelftesten zal de testbereidheid vermoedelijk verhogen. Deze strategie kan ook een delay voorkomen bij het eventueel weer opstarten van teststraten.	Overweeg zelftesten te adviseren bij medewerkers zonder klachten bij: - Teamgerelateerde uitjes, buiten de muren van de zorginstelling: voor het uitje een zelftest uitvoeren (dit om selectieve uitval binnen teams te voorkomen).