

ADVIES

Aan : ROAZ GHOR Strategisch Kernteam COVID-19.
Van : RAI-NN i.o. (SIF/REDIAM/UMCG MMBI/GGD-en)
Onderwerp : Update infectiepreventie maatregelen rond COVID-19
Datum : 03-09-2021

Inleiding

Stand van zaken periode 16 – 22 augustus: week totaal aantal besmettingen per 100.000 inwoners: Groningen 76.1, Drenthe 57.1, Friesland 100.5.

Risiconiveaus op 18 augustus: Groningen ernstig, Friesland en Drenthe zorgelijk.

Het is lastig te voorspellen wat de komende 1 à 2 maanden zal gebeuren ten aanzien van besmettingen en druk op de bedden capaciteit. Factoren die hierbij een rol spelen zijn het huidige vrij hoge niveau van circulatie van de delta variant, de impact van terugkerende reizigers, het opstarten van het onderwijs (basis, middelbaar, MBO, HBO en WO) en de voorgestelde stappen door het kabinet ten aanzien van het verder openen van de samenleving. Deze onzekerheid als gevolg van deze factoren wordt meegenomen in het huidige advies.

Advies:

Het advies is om de bestaande maatregelen, zoals gesteld in de adviesbrief van RAI-NN d.d. 14 juli 'Aanvullende maatregelen bij toenemende incidentie SARS-CoV-2' te continueren tot nader order. We maken een splitsing in het advies tussen ziekenhuiszorg, non-ziekenhuis intramurale zorg en zorg in de thuissituatie (inclusief ambulante GGZ en Beschermd Wonen GGZ).

Er volgt een nieuw advies wanneer er landelijk een significante wijziging in beleid wordt doorgevoerd ofwel er een duidelijke verandering in risiconiveau ontstaat. Daarbij moet gezegd worden dat een landelijk versoepeling mogelijk niet direct wordt vertaald in een versoepeling in de zorg in NN; juist bij landelijke versoepelingen kunnen strengere maatregelen in de zorg geadviseerd worden.

Toelichting vigerende advies:

We maken voor de komende periode een splitsing in het advies tussen ziekenhuiszorg, non-ziekenhuis intramurale zorg en zorg in de thuissituatie (inclusief ambulante GGZ en Beschermd Wonen GGZ).

Binnen de ziekenhuizen is sprake van extra kwetsbare groepen en is de turnover van de patiënten groter. Binnen de non-ziekenhuis intramurale zorg en bij zorg in de thuissituatie is sprake van een woonsituatie; het verblijf is veel langer en er is een streven naar kwaliteit van leven gewenst. Echter, dit moet eveneens afgewogen worden tegen de risico's en de kwetsbaarheid van de populatie in de betreffende instelling.

Algemeen

- Houd bijeenkomsten beperkt tot wat mogelijk is per ruimte, met in achtneming van de 1,5 meter afstand.
- Bereid voor hoe wordt omgegaan met diagnostiek en maatregelen bij circulatie van influenza A/B en andere virale infecties. Hiervoor wordt een regionaal advies voorbereid door de RAI-NN.

Ziekenhuiszorg:

- Mondneusmasker gebruik:
 - Voor zorgmedewerkers altijd chirurgisch mondneusmaskers IIR.
 - Voor medewerkers geldt op kantoren/overleg ruimtes dat het mondneusmasker af mag, mits de 1.5 meter gewaarborgd is.
 - Bezoekers wordt geadviseerd een mondneusmasker te dragen.
- Bezoekersbeleid ongewijzigd: creëer in de eigen instelling maatregelen waardoor het maximaal aantal personen dat op 1.5 meter aanwezig kan zijn niet overschreden wordt. Voorkom hier situaties dat medewerkers mensen moeten weren of wegsturen. Zorg voor duidelijke planning of accepteer minder bezoekers.

Non-ziekenhuis Intramurale zorg:

Volg de maatregelen zoals geadviseerd in het Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg versie 09-08-2021 van Verenso. Hierin wordt in paragraaf 2.2 "Maatregelen bij verhoogde (boven)regionale prevalentie" geadviseerd om bij risiconiveau zorgelijk of hoger, zoals de huidige situatie, extra algehele maatregelen te handhaven, waaronder:

- Verminder verplaatsingen van zorgprofessionals tussen locaties/afdelingen/woongroepen.
- Voer een strikter opname/overplaatsingsbeleid.
- Preventief gebruik van mondneusmasker door medewerkers (minimaal chirurgisch type IIR) en bezoekers. Dit geldt voor de verpleeghuissector, intramurale GGZ en voor instellingen in de VG-zorg met aan verpleeghuispopulatie gelijkwaardige kwetsbare doelgroepen. Instellingen en zorgprofessionals kunnen op basis van professionele overweging tot strengere maatregelen besluiten.

Zorg in de thuissituatie:

- Bij zorg in de thuissituatie in een periode met verhoogde (boven)regionale circulatie (niveau zorgelijk of hoger), zoals de huidige situatie: werk met chirurgisch mondneusmasker IIR bij zorg op <1,5 m. Zorgprofessionals kunnen op basis van professionele overweging besluiten reeds bij het betreden van een woning of kamer een mondneusmasker te dragen.