



INFECTIEPREVENTIE HANDSCHOENWEEK

BESPREEKKAART

Quizvraag

Waarom is onnodig en/of onjuist handschoenen-gebruik juist risicoverhogend voor de patiënt én jezelf op het krijgen van een infectie?





INFECTIEPREVENTIE HANDSCHOENWEEK

BESPREEKKAART

Antwoord

Uit de literatuur blijkt dat handschoenen vaak als vervanger van handhygiëne worden gebruikt. Hoe meer handschoenen er worden gebruikt, hoe minder goed handhygiëne wordt toegepast. Hierdoor kunnen micro-organismen vanaf je handen verspreiden naar zowel de patiënt als jezelf.

Daarnaast zijn er andere manieren waarop handschoenen vaak incorrect worden gebruikt. In de tabel worden enkele voorbeelden gegeven met de bijbehorende risico's voor jezelf en de patiënt (bespreek er bijvoorbeeld drie).

Handeling	Infectierisico
Dezelfde handschoenen bij meerdere patiënten dragen	Verspreiden van pathogene micro-organismen van de ene patiënt naar de andere
Handschoenen te lang dragen (langer dan 20 minuten)	In handschoenen zitten kleine gaatjes die groter worden naarmate je ze langer draagt. Risico dat jouw handen besmet raken.
Dezelfde handschoenen dragen tijdens een vuile en schone handeling bij dezelfde patiënt	Pathogene micro-organismen verspreiden vanuit een vuil gebied (bv. wond) naar een schoon gebied (bv. intravasale katheter).
De omgeving aanraken met handschoenen aan	Pathogene micro-organismen vanuit de omgeving verspreiden naar de patiënt, óf pathogene micro-organismen van de patiënt verspreiden naar de omgeving.
Geen handhygiëne toepassen vóór aantrekken van handschoenen	Handschoenen met 'vuile' handen pakken en zo pathogene micro-organismen verspreiden naar de patiënt
Geen handhygiëne toepassen ná uittrekken van handschoenen	Pathogene micro-organismen verspreiden naar jezelf doordat handen van zorgprofessionals vaak besmet raken tijdens het uittrekken van handschoenen. Ook beschermen handschoenen niet volledig tegen contact met micro-organismen (zie punt 2).