

DEFINITIEF ADVIES

vastgesteld 15-03-2023 door ROAZ GHOR Strategisch Kernteam COVID-19

Aan : ROAZ GHOR Strategisch Kernteam COVID-19

Van : RAI-NN (SIF/REDIAM/UMCG MMBI/GGD-en)

Onderwerp : Herzien Fasen schema COVID-19 maatregelen voor ziekenhuiszorg en niet-ziekenhuiszorg

Datum : 06-03-2023

Nu er geen sprake meer is van een COVID pandemie maar een endemische fase is het fasen schema COVID-19 maatregelen aangepast. Dit advies gaat in zodra het kabinet het OMT advies d.d. 22-02-2023 overneemt.

Samenvatting:

- **Aanpassingen van toepassing in fase laag**
- Het mondneusmaskerbeleid is afgeschaald naar alleen mondneusmasker bij respiratoire klachten, zowel voor medewerker, patiënt als bezoeker
- Het testen van medewerkers is niet meer nodig;
- Voor COVID afval en linnengoed zijn er geen aparte maatregelen meer van toepassing

Voor het respiratoire seizoen heeft de RAI werkgroep op- en afschalen een fasen schema opgesteld. Het doel van het fasen schema is in de basis het borgen van de patiëntveiligheid. Naarmate de fase waarin we verkeren zal verhogen, wordt de aandacht ook verlegd naar de personele capaciteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers, met in gedachten de zorgcontinuïteit. Uitgangspunt is dat de maatregelen in proportie zijn met de risico's die er beheerst moeten worden.

Dit fasen schema geeft per fase de infectiepreventie maatregelen aan in relatie tot COVID. De fase waarin we verkeren is onderhevig aan verandering op basis van regionale en landelijke wijzigingen. De basismaatregelen blijven van kracht; pas handhygiëne toe, testen bij klachten en geef elkaar de ruimte ([Adviezen om corona en ook andere infectieziekten te voorkomen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)).

In dit advies zijn de fasen gekoppeld aan de coronathermometer ([Coronathermometer | Dashboard Coronavirus | Rijksoverheid.nl](#)). Deze thermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie in Nederland (o.a. rioolwatersurveillance, het aantal positieve testen, eventuele nieuwe (pathogene) varianten, ziekenhuisopnames enz.). De coronathermometer is echter geënt op de impact van het virus op de maatschappij. Als RAI hebben we te maken met druk op de zorginstellingen (toename van opnames en uitval van personeel) en kan het daarom zijn dat we eerder opschalen naar een hogere fase. Dit wordt regionaal afgestemd.

	Laag <i>(impact op de samenleving en de zorg door ziektelast van het virus is laag)</i>	Verhoogd <i>(impact op de samenleving en de zorg door ziektelast van het virus is verhoogd. Vooral kwetsbare groepen lopen meer risico)</i>	Hoog <i>(impact op de samenleving en de zorg door ziektelast van het virus is hoog)</i>	Zeer hoog <i>(impact op de samenleving en de zorg door ziektelast van het virus is merkbaar voor iedereen)</i> <u>Bij introductie nieuwe ziekmakende variant</u>
Mondneusmasker medewerker	Overweeg het dragen van een chirurgisch mondneusmasker IIR binnen 1,5m van de patiënt bij bv. hematologie en transplantatie patiënten Draag bij verkoudheidsklachten continu een chirurgisch mondneusmasker IIR	Overweeg het dragen van een chirurgisch mondneusmasker IIR binnen 1,5m van de patiënt Draag bij verkoudheidsklachten continu een chirurgisch mondneusmasker IIR	Draag in de patiëntenzorg continu een chirurgisch mondneusmasker IIR Het chirurgisch mondneusmasker IIR mag alleen af bij zitten mits 1,5m afstand Draag bij verkoudheidsklachten continu een chirurgisch mondneusmasker IIR	Iedereen binnen de zorginstelling draagt continu een chirurgisch mondneusmasker IIR Het chirurgisch mondneusmasker IIR mag alleen af bij eten en drinken mits 1,5m afstand

Mondneusmasker Bezoeker / patiënt	Chirurgisch mondneusmasker IIR bij de ingang aanbieden Bij verkoudheidsklachten draagt men een chirurgisch mondneusmasker IIR (indien patiënt met verkoudheidsklachten geen chirurgisch mondneusmasker IIR draagt, draagt de medewerker een chirurgisch mondneusmasker IIR ter bescherming)	Chirurgisch mondneusmasker IIR bij de ingang aanbieden Bij verkoudheidsklachten draagt men een chirurgisch mondneusmasker IIR (indien patiënt met verkoudheidsklachten geen chirurgisch mondneusmasker IIR draagt, draagt de medewerker een chirurgisch mondneusmasker IIR ter bescherming)	Chirurgisch mondneusmasker IIR bij de ingang aanbieden Bij verkoudheidsklachten draagt men een chirurgisch mondneusmasker IIR	Iedereen binnen de zorginstelling draagt continu een chirurgisch mondneusmasker IIR Het chirurgisch mondneusmasker IIR mag alleen af bij eten en drinken mits 1,5m afstand Afhankelijk van ziekmakendheid van de variant beleid voor bezoekers en patiënten aangepassen
--	--	--	---	--

Testbeleid medewerkers	Het testen van medewerkers vervalt	Bij klachten testen Gebruik bij voorkeur een PCR test Zelftesten kunnen geaccepteerd worden met de voorwaarde dat de opeenvolgend uitgevoerd worden op dag 1 en 2 van de klachten	Bij klachten testen Gebruik bij voorkeur een PCR test Zelftesten kunnen geaccepteerd worden met de voorwaarde dat de opeenvolgend uitgevoerd worden op dag 1 en 2 van de klachten	Bij klachten testen Gebruik bij voorkeur een PCR test Zelftesten kunnen geaccepteerd worden met de voorwaarde dat de opeenvolgend uitgevoerd worden op dag 1 en 2 van de klachten Bij introductie van een ziekmakende variant heroverweeg testbeleid
Testbeleid patiënten	Testen indien het consequenties heeft voor de individuele aanpak en behandeling, zoals voor inzet isolatiemaatregelen Diagnostiek middels PCR	Testen bij klachten Diagnostiek middels PCR	Testen bij klachten Diagnostiek middels PCR	Testen bij klachten Diagnostiek middels PCR Overweeg opname en pre-OK screening

Inzet positieve medewerker (niet strikt gebonden aan fasen als wel continuïteit van zorg)	Het advies: 220216 Advies RAI-NN inzet positieve medewerkers igv extreme besmettingscijfers (abrzn.nl) vervalt Medewerkers worden niet meer getest. Net als voor andere luchtweginfecties geldt: Draag bij verkoudheidsklachten continu een chirurgisch mondneusmasker IIR	Inzet positieve medewerker zonder klachten Zie adviezen: 220216 Advies RAI-NN inzet positieve medewerkers igv extreme besmettingscijfers (abrzn.nl) 220712-Addendum-Advies-RAI-NN -inzet-positieve-medewerker-zh-zorg-en-non-zh-zorg.pdf (abrzn.nl)	Inzet positieve medewerker met klachten Zie adviezen: 220216 Advies RAI-NN inzet positieve medewerkers igv extreme besmettingscijfers (abrzn.nl) 220712-Addendum-Advies-RAI-NN -inzet-positieve-medewerker-zh-zorg-en-non-zh-zorg.pdf (abrzn.nl) 221012-RAI-NNL Toelichting-inzet-positief-geteste-medewerkers-met-klachten.pdf (abrzn.nl)	Inzet positieve medewerker met klachten Zie adviezen: 220216 Advies RAI-NN inzet positieve medewerkers igv extreme besmettingscijfers (abrzn.nl) 220712-Addendum-Advies-RAI-NN -inzet-positieve-medewerker-zh-zorg-en-non-zh-zorg.pdf (abrzn.nl) 221012-RAI-NNL Toelichting-inzet-positief-geteste-medewerkers-met-klachten.pdf (abrzn.nl)
Maatregelen/hulpmiddelen om 1.5 m te borgen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Inrichten om 1,5m te borgen
COVID linnengoed en afval	Geen aparte maatregelen			
Fysieke bijeenkomsten/koffieruimten	Geen beperkingen	Geen beperkingen	Digitale bijeenkomsten waar mogelijk	Fysieke bijeenkomsten tot het minimum beperken (op basis van

				grootte ruimte/1,5m) en met chirurgisch mondneusmasker IIR
Restaurant	Geen beperkingen	Geen beperkingen	Geen beperkingen	Inrichten om 1,5m te borgen
Horeca	Geen beperkingen	Afhankelijk van landelijke richtlijnen	Afhankelijk van landelijke richtlijnen	Afhankelijk van landelijke richtlijnen